

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Търговско име на лекарствения продукт Cinnabsin - Цинабсин

2. Количествен и качествен състав

1 таблетка (250 mg) съдържа:

Лекарствени вещества:

Cinnabaris trit. D3	25 mg
Echinacea trit. D1	25 mg
Hydrastis trit. D3	25 mg
Kalium bichromicum trit. D3	25 mg

Помощни вещества:

За пълния списък на помощните вещества виж 6.1

3. Фармацевтична форма

Таблетки

4. Клинични данни

4.1 Показания

За лечение на остри и хронични синусити.

4.2 Дозировка и начин на употреба

Да се следва посочената дозировка или както е предписано от лекуващия лекар.

При остри оплаквания: Възрастни приемат по една таблетка през едночасови интервали, до максимум 12 таблетки на ден; деца от 2 до 6 годишна възраст приемат 1 таблетка на всеки 1-2 часа до максимум 6 таблетки дневно, а деца от 6 до 12 години – 1 таблетка на всеки 1-2 часа до максимум 9 таблетки дневно, докато настъпи подобрене. *За последващо лечение* се приема по 1 таблетка 3 дневно.

В случай на хроничен синусит дозировката за деца и възрастни е 1 таблетка 3 пъти дневно.

Таблетките се приемат половин час преди или след хранене и се оставят да се разтопят бавно в устата. За малки деца е препоръчително таблетките да се разтварят в малко вода.

Да не се приема за повече от 8 седмици без консултация с лекуващия лекар.

Да не се прилага при деца под две годишна възраст поради липса на данни при употребата на продукта в тази възраст.

4.3 Противопоказания

Да не се приема от пациенти, които са свръхчувствителни към хром, ехинацея, други сложноцветни растения или други съставки на продукта.

Цинабсин не трябва да бъде приеман от хора с прогресивни системни заболявания като туберкулоза, левкемия и левкоза, възпалителни заболявания на съединителната тъкан, аутоимунни заболявания, мултипленна склероза, СПИН, HIV – инфекция и други хронични вирусни заболявания.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1 11-6134/04.11.09
Към РУ 11-2224/18.10.09
Одобрено: N= 1/05.10.2009



4.4 Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Пациенти, които страдат от наследствена галактозна непоносимост, Lapp лактазна недостатъчност или глюкозен / галактозен синдром на малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

Пшеничното нишесте може да съдържа глютен, но в незначителни количества, поради това употребата на продукта при пациенти с цьолиакия се счита за безопасна.

Ако симптомите продължават или състоянието се влоши е необходима преоценка на лечението.

4.5 Лекарствени и други взаимодействия

Не са известни

4.6 Бременност и кърмене

Както при всички други лекарствени продукти, по време на бременност и кърмене, Цинабсин трябва да бъде приеман само след предварителна консултация с лекар.

4.7 Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не са известни.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

В отделни случаи след приемане на Цинабсин може да се получи повишаване на слюноотделянето. В такива случаи е препоръчително да се намали дозата или да се преустанови лечението.

В редки случаи могат да възникнат реакции на свръхчувствителност. Има докладвани случаи на кожни обриви, сърбеж и рядко на изпотяване на лицето, диспнея, световъртеж и спадане на кръвното налягане, след приемане на лекарствени продукти, съдържащи ехинацея. В тези случаи да се преустанови лечението и да се потърси консултация от лекар.

4.9 Предозиране

Няма съобщени случаи на предозиране.

5. Фармакологични данни

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група:

АТС код:

5.2 Фармакокинетични свойства

Няма данни.

Хомеопатичната терапия се различава значително от конвенционалната медицина по отношение на разбирането за заболяванията и използването на лечебните вещества. Хомеопатичните средства не се използват като сурови материали или билки. Те обикновено са потенцирани, чрез последователни разреждания и разбиване. Затова хомеопатията е регулираща терапия, която не влияе директно на симптомите. Хомеопатичните средства стимулират механизмите за собствена защита на организма и по този начин активират самолечителните сили. Хомеопатията не е предимно лекарствена терапия, тъй като желаното действие е собствената реакция на организма. Отговорът на организма към хомеопатичните действия е строго индивидуален, според различните симптоми. Поради това не могат да бъдат определени специфични фармакологични ефекти, фармакокинетични и фармакодинамични данни.



6. Фармацевтични данни

6.1 Списък на помощните вещества

Лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, пшенично нишесте.

6.2 Физико-химични несъвместимости

Не са известни

6.3 Срок на годност

5 години

6.4 Специални условия за съхранение

Да се съхранява при стайна температура

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

6.5 Опаковка

Алуминиеви блистери от 20 таблетки в картонена опаковка с инструкции за употреба.
100 таблетки в опаковка.

6.6 Инструкции за изхвърляне:

Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24

76227 Karlsruhe

Germany

Медицинско представителство в България:

Либра ЕАД

8. Регистрационен № в Регистъра по чл. 28 от ЗЛАХМ

20040295

9. Дата на първо разрешаване за употреба на лекарствения продукт (подновяване на разрешението)

10. Дата на (частична) актуализация на текста

Ноември 2008

