

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

КИЕТЮД, сироп  
QUIETUDE, syrup  
Хомеопатичен лекарствен продукт

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Към Рег. №	20021045
Разрешение №	2722 / 06-11-2013
Одобрение №	/

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание при деца на 30 месечна възраст. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява **КИЕТЮД, сироп**, и за какво се използва?
2. Преди да приемете **КИЕТЮД, сироп**
3. Как да приемате **КИЕТЮД, сироп**?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **КИЕТЮД, сироп**?
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КИЕТЮД, сироп, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?**

**КИЕТЮД, сироп**, е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при деца над 1 година при случаи на нервност и при леки нарушения на съня.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ КИЕТЮД, сироп**


**Не приемайте КИЕТЮД, сироп:**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество(а) или към някоя от останалите съставки на **КИЕТЮД, сироп**.

**Обърнете специално внимание при употребата на КИЕТЮД, сироп**

**Този лекарствен продукт не трябва да се дава на деца под 30 месечна възраст без лекарско мнение.**

- Лекарствен продукт за деца над 1 година.
- Причините за нарушения на съня при деца изискват консултация с лекар. Необходимо е да се потърси и установи причината за нарушението на съня.



- Курсът на лечение трябва да бъде толкова кратък, колкото е възможно, и трябва да се прекрати след изчезването на симптомите. Ако симптомите не се повлияят след три дни лечение, консултирайте се с Вашия лекар.
- Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.
- Този лекарствен продукт съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg в една доза.

#### **Прием на други лекарства**

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

#### **Прием на КИЕТЮД, сироп, с храни и напитки**

Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

#### **Бременност и кърмене**

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

#### **Шофиране и работа с машини**

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Киетюд сироп е предназначен за деца.

#### **Важна информация относно някои от съставките на КИЕТЮД, сироп**

Списък на помощните вещества с доказан ефект: етанол, захароза.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КИЕТЮД, сироп?**

Перорално приложение.

**Да не се дава на деца под 30 месечна възраст без лекарско мнение.**

**Лекарствен продукт за деца над 1 година.**

При преходна нервност и при леки нарушения на съня: да се взима по 1 доза от 5 ml от сиропа, измерена с мерителна чашка, сутрин и вечер.

Курсът на лечение трябва да се прекрати веднага след изчезване на симптомите и трябва да бъде възможно най-кратък.

Курсът на лечение трябва да се определи от лекуващия лекар при деца под 30 месечна възраст.

Курсът на лечение не трябва да надвишава 10 дни при деца над 30 месечна възраст.

Ако симптомите продължават, лечението трябва да се преоцени.

**Ако сте приели повече от необходимата доза КИЕТЮД, сироп:**

Посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт.

**Ако сте пропуснали да приемете КИЕТЮД, сироп:**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.



**Ако сте спрели приема на КИЕТЮД, сироп:**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, **КИЕТЮД, сироп**, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са наблюдавани нежелани реакции.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КИЕТЮД, сироп?**

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте **КИЕТЮД, сироп**, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

**КИЕТЮД, сироп**, може да се използва до 6 месеца след датата на първоначалното отваряне на бутилката.

**6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Какво съдържа КИЕТЮД, сироп?**

Състав за 100 g

- Активните вещества са:

Chamomilla vulgaris (Лайка) 9 СН .....	1,5 g
Gelsemium (Жълт жасмин) 9 СН .....	1,5 g
Hyoscyamus niger (Черен блян) 9 СН .....	1,5 g
Kalium bromatum (Калиев бромид) 9 СН.....	1,5 g
Passiflora incarnata (Страстоцвет) 3 ДН .....	1,5 g
Stramonium (Татул) 9 СН .....	1,5 g



- Другите съставки са:  
Захароза, етанол 96%, бензоена киселина, карамел, вода.

**Как изглежда КИЕТЮД, сироп, и какво съдържа опаковката?**  
Сироп в бутилка от 200 ml с мерителна чашка.

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

**BOIRON**  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
Франция

**Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2013 г.**

