

**Публичен оценъчен доклад – резюме
Генеричен лекарствен продукт**

**ОВВО Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия
в саше**

OWWO Junior Flu 200 mg/5 mg oral suspension in sachet

**ОВВО Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в
саше**

OWWO Forte Flu 400 mg/10 mg oral suspension in sachet

**Ibuprofen/Phenylephrine hydrochloride
Ибупрофен/Фенилефринов хидрохлорид**

Дата: 17.03.2026

OBBO Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше
OWWO Junior Flu 200 mg/5 mg oral suspension in sachet

OBBO Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше
OWWO Forte Flu 400 mg/10 mg oral suspension in sachet

Ibuprofen/Phenylephrine hydrochloride
Ибупрофен/Фенилефрин хидрохлорид

Това е обобщение на оценъчния доклад за лекарствените продукти OBBO Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и OBBO Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше. Тук се обяснява как лекарствените продукти са били оценени и защо се препоръчва разрешаване за употреба, както и условията за употреба. Този документ не е предназначен да дава практическа информация как да се използват.

За практическа информация относно употребата на OBBO Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и OBBO Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше, пациентите трябва да прочетат листовката или да се консултират с лекаря или фармацевта си.

Какво представляват OBBO Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и OBBO Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше и за какво се използват?

OBBO Юноши Грип и OBBO Форте Грип съдържат ибупрофен и фенилефрин хидрохлорид. Ибупрофен принадлежи към група лекарства, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), чието действие включва модифициране на отговора на организма към болка, възпаление и повишена телесна температура. Фенилефрин хидрохлорид намалява отока на носната лигавица и по този облекчава хремата и запушения нос.

Тези продукти са показани за бързо и ефективно облекчаване на симптоми при грип и простудни заболявания като висока температура, втрисане, възпаление, главоболие, мускулни болки, костни и ставни болки, включително болки в гърба, болки в ушите, сухота и болки в гърлото, болки в синусите, запушен нос и синуси, хрема.

Как действат OBBO Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и OBBO Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше?

Ибупрофен

Ибупрофен принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни средства. Механизмът на действие на ибупрофен включва инхибиране на простагландиновата синтеза. Ибупрофен намалява болката, отока и температурата, причинени от възпаление. Освен това, той инхибира необратимо тромбоцитната агрегация.

Терапевтичният ефект на ибупрофен при грипоподобни симптоми продължава до 8 часа.

Експерименталните данни показват, че при едновременен прием ибупрофен може конкурентно да потиска ефекта на ниски дози ацетилсалицилова киселина по отношение на тромбоцитната агрегация. Някои фармакодинамични проучвания показват, че когато се приемат единични дози ибупрофен 400 mg до 8 ч преди или 30 мин след прием на ацетилсалицилова киселина с непосредственото освобождаване (81 mg), се отслабва

ефектът по отношение на образуването на тромбоксан или тромбоцитната агрегация. Въпреки че има неясноти относно екстраполирането на тези данни към клиничния случай, не може да се изключи възможността редовната дългосрочна употреба на ибупрофен да намалява кардиопротективния ефект на ацетилсалицилова киселина в ниски дози. Смята се, че няма голяма вероятност обичайната употреба на ибупрофен да доведе до клинично значим ефект.

Фенилефрин

Фенилефринът е постсинаптичен алфа-рецепторен агонист с нисък кардиоселективен бета-рецепторен афинитет и минимална стимулираща активност. Има доказан деконгестантен ефект, като действа чрез свиване на кръвоносните съдове, за да намали отока и конгестията в носа.

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, ако имате някакви въпроси за това как действат ОВВО Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и ОВВО Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше или защо Ви е предписано това лекарство.

Как се използват ОВВО Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и ОВВО Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше?

Лекарствената форма на ОВВО Юноши Грип 200 mg/5 mg и ОВВО Форте Грип 400 mg/10 mg е перорална суспензия в саше.

ОВВО Юноши Грип

Препоръчителната доза е:

Деца от 7 до 9 години (21-29 kg): 1 саше (5 ml) до 3 пъти дневно

Деца от 10 до 12 години (30-39 kg): 1 саше (5 ml) до 4 пъти дневно

Възрастни и юноши над 12 години (≥ 40 kg): 2 сашета (2 x 5 ml) до 3 пъти дневно.

Дозите трябва да се приемат приблизително на всеки 6 до 8 часа.

Да не се надвишава препоръчителната доза на това лекарство.

Най-ниската ефективна доза трябва да се използва за възможно най-краткото време, необходимо за облекчаване на симптомите. Ако имате инфекция, незабавно се консултирайте с лекар, ако симптомите (напр. повишена температура и болка) продължават или се влошават (вж. точка 2 на листовката за пациента).

Ако симптомите продължават повече от 3 дни или се влошат, трябва да се консултирате с лекар.

Приемът на това лекарство в най-малката ефективна доза и за възможно най-краткото време за облекчаване на симптомите намалява риска от нежелани реакции.


Специални инструкции за употреба

Това лекарство е предназначено за перорална употреба.

ОВВО Юноши Грип се приема директно от сашето в устата, след което трябва да се изпие чаша вода.

При пациенти с чувствителен стомах се препоръчва това лекарство да се приема по време на хранене.

В горната част на сашето има линия, по която може да го отворите и да изпразните съдържанието му. Преди отваряне, сашето трябва да се размачка, за да се смесят съставките, както е описано на следващата фигура:



1. Натиснете с пръсти горната и долната част на сашето няколко пъти.
2. Натиснете отгоре и отдолу и обратно за минимум 30 секунди.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ОБВО Юноши Грип

При случайно предозиране на това лекарство, незабавно се консултирайте с лекар или фармацевт.

Ако Вие сте използвали прекалено голяма доза от ОБВО Юноши Грип или ако това лекарство случайно е било прието от деца, свържете се с лекар възможно най-бързо или посетете най-близката болница, за да получите мнение за риска и съвет за действия, които трябва да се предприемат.

Симптомите на предозиране може да включват гадене, повръщане (примесено с кръв), болка в стомаха, шум (звънтене) в ушите, главоболие, обърканост и бързи, неволеви движения на очите. При високи дози е съобщавано за сънливост, болка в гърдите, сърцебиене, загуба на съзнание, гърчове (главно при деца), слабост и замаяност, кръв в урината, ниски нива на калий в кръвта, усещане за студ и проблеми с дишането. Също така, протромбиновото време (INR) може да се удължи поради намеса в циркулиращите фактори на кръвосъсирването. Възможно е да настъпи остра бъбречна недостатъчност и чернодробно увреждане. При пациенти с астма може да се наблюдава влошаване. Предозирането може да доведе до поява на хипотония и затруднено дишане.

Ако сте пропуснали да използвате ОБВО Юноши Грип

Не вземайте или не давайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте забравили да приемете доза, вземете я веднага щом си спомните, след което приемете следващата доза, съгласно указанията за дозовия интервал, описани по-горе.

ОБВО Форте Грип

Препоръчителната доза е:

Възрастни и юноши над 12 години (≥ 40 kg): 1 саше (10 ml) до 3 пъти дневно.

Дозите трябва да се приемат приблизително на всеки 6 до 8 часа.

Да не се надвишава препоръчителната доза на това лекарство.

Най-ниската ефективна доза трябва да се използва за възможно най-краткото време, необходимо за облекчаване на симптомите. Ако имате инфекция, незабавно се консултирайте с лекар, ако симптомите (напр. повишена температура и болка) продължават или се влошават (вж. точка 2 на листовката за пациента).

Ако симптомите продължават повече от 3 дни или се влошат, трябва да се консултирате с лекар.

Приемът на това лекарство в най-малката ефективна доза и за възможно най-краткото време за облекчаване на симптомите намалява риска от нежелани реакции.


Специални инструкции за употреба

Това лекарство е предназначено за перорална употреба.

ОБВО Форте Грип се приема директно от сашето в устата, след което трябва да се изпие чаша вода.

При пациенти с чувствителен стомах се препоръчва това лекарство да се приема по време на хранене.

В горната част на сашето има линия, по която може да го отворите и да изпразните съдържанието му. Преди отваряне, сашето трябва да се размачка, за да се смесят съставките, както е описано на следващата фигура:



1. Натиснете с пръсти горната и долната част на сашето няколко пъти.
2. Натиснете отгоре и отдолу и обратно за минимум 30 секунди.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ОБВО Форте Грип

При случайно предозиране на това лекарство, незабавно се консултирайте с лекар или фармацевт.

Ако Вие сте използвали прекалено голяма доза от ОБВО Форте Грип или ако това лекарство случайно е било прието от деца, свържете се с лекар възможно най-бързо или посетете най-близката болница, за да получите мнение за риска и съвет за действия, които трябва да се предприемат.

Симптомите на предозиране може да включват гадене, повръщане (примесено с кръв), болка в стомаха, шум (звънтене) в ушите, главоболие, обърканост и бързи, неволеви движения на очите. При високи дози е съобщавано за сънливост, болка в гърдите, сърцебиене, загуба на съзнание, гърчове (главно при деца), слабост и замаяност, кръв в урината, ниски нива на калий в кръвта, усещане за студ и проблеми с дишането. Също така, протромбиновото време (INR) може да се удължи поради намеса в циркулиращите фактори на кръвосъсирването. Възможно е да настъпи остра бъбречна недостатъчност и чернодробно увреждане. При пациенти с астма може да се наблюдава влошаване. Предозирането може да доведе до поява на хипотония и затруднено дишане.

Ако сте пропуснали да използвате ОБВО Форте Грип

Не вземайте или не давайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте забравили да приемете доза, вземете я веднага щом си спомните, след което приемете следващата доза, съгласно указанията за дозовия интервал, описани по-горе.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не използвайте ОБВО Юноши Грип

- ако Вие или детето Ви сте алергични към ибупрофен, фенилефрин хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б),
- ако Вие или детето Ви сте имали язва, перфорация или стомашно-чревно кървене,
- ако Вие или детето Ви някога сте имали реакция (например астма, хрема, подуване на лицето) след приемане на ацетилсалицилова киселина или други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС),
- ако Вие или детето Ви някога сте имали стомашно-чревно кървене или перфорация след прием на НСПВС,
- ако Вие или детето Ви приемате други болкоуспокояващи средства от групата на НСПВС,
- ако Вие или детето Ви приемате повече от 75 mg ацетилсалицилова киселина дневно,

- ако Вие или детето Ви имате тежки чернодробни или бъбречни заболявания,
- ако Вие или детето Ви имате тежко сърдечно заболяване (заболяване, което води до лесна уморяемост, задух, подуване на глезените и др.), високо кръвно налягане или нарушения в кръвосъсирването,
- ако Вие или детето Ви имате мозъчен удар и кръвоизливи,
- ако Вие или детето Ви имате хипертиреоидизъм (увеличена функция на щитовидната жлеза, която може да причини засилване на апетита, загуба на тегло или изпотяване, безсъние, нервност и др.),
- ако Вие или детето Ви приемате или сте приемали през последните 14 дни МАО-инхибитор (лекарства за лечение на депресия),
- ако сте в последните три месеца от бременността.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате ОБВО Юноши Грип, ако Вие или детето Ви:

- имате или сте имали астма;
- имате бъбречни, сърдечни, чернодробни или чревни нарушения,
- имате висок холестерол или сте претърпели инфаркт или инсулт,
- имате стомашно-чревни заболявания (улцерозен колит, болест на Крон),
- имате лупус еритематозус (заболяване на имунната система, което причинява болки в ставите, кожни промени или други органни нарушения) и смесена съединително-тъканна болест,
- сте пушач,
- сте в първите шест месеца от бременността,
- имате диабет,
- имате глаукома,
- имате простатна хипертрофия,
- приемате ниски дози ацетилсалицилова киселина дневно (до 75 mg дневно),
- имате инфекция – вж. заглавието „Инфекции“ по-долу.

Инфекции

ОБВО Юноши Грип може да скрие признаците на инфекции, например повишена температура и болка. Поради това е възможно ОБВО Юноши Грип да забави подходящото лечение на инфекцията, което може да доведе до повишен риск от усложнения. Това се наблюдава при пневмония, причинена от бактерии и бактериални кожни инфекции, свързани с варицела. Ако приемате това лекарство, докато имате инфекция и симптомите на инфекцията продължават или се влошават, трябва да се консултирате незабавно с лекар.

Кожни реакции

Сериозни кожни реакции, включително ексфолиативен дерматит, еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза, лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS), остра генерализирана екзантематозна пустулоза, са съобщавани във връзка с лечението с ибупрофен. Прекратете употребата на ОБВО Юноши Грип и незабавно потърсете медицинска помощ, ако забележите някой от симптомите, свързани със сериозните кожни реакции, описани в точка 4. Възможни нежелани реакции.

Признаци на алергична реакция към това лекарство, включително проблеми с дишането, подуване в областта на лицето и шията (ангиоедем), болка в гърдите, са съобщавани при ибупрофен. Прекратете незабавно употребата на ОБВО Юноши Грип и се свържете незабавно с Вашия лекар или потърсете незабавно спешна медицинска помощ, ако забележите някой от тези признаци.

Противовъзпалителните/болкоуспокояващите лекарства като ибупрофен могат да са свързани със слабо увеличаване на риска от сърдечен инфаркт или инсулт, особено когато се употребяват във високи дози. Не превишавайте препоръчителната дозировка или продължителност на лечението.

Трябва да се обсъди лечението с лекар или фармацевт, преди да се приеме ОВВО Юноши Грип в случай на:

- сърдечни проблеми, включително сърдечна недостатъчност и стенокардия (гръдна болка), или при прекаран сърдечен инфаркт, операция за поставяне на байпас, периферна артериална болест (влошена циркулация в краката или ходилата поради стеснени или запушени артерии) или какъвто и да е вид инсулт (включително микроинсулт или преходна исхемична атака);
- високо кръвно налягане, диабет, висок холестерол, фамилна анамнеза за сърдечно заболяване или инсулт или тютюнопушене.

Деца и юноши

Съществува риск от бъбречна недостатъчност при употреба от дехидратирани деца и юноши.

Други лекарства и ОВВО Юноши Грип

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вие (или детето Ви) приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

За да намалите риска от нежелани реакции, избягвайте да приемате това лекарство едновременно с други НСПВС (като ацетилсалицилова киселина). Ако приемате ниски дози ацетилсалицилова киселина (до 75 mg дневно), посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

ОВВО Юноши Грип може да може да повлияе или действието му да бъде повлияно от други лекарства.

Избягвайте приема на ОВВО Юноши Грип със следните лекарства:

- кортикостероиди, използвани за лечение на астма и други възпалителни заболявания (като преднизолон, беклометазон),
- хинолонови антибиотици, използвани за лечение на бактериални инфекции (като ципрофлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин),
- антикоагуланти (т.е. разреждат кръвта/предотвратяват кръвосъсирването, например ацетилсалицилова киселина, варфарин, тиклодипин),
- лекарства за лечение на сърдечни заболявания (напр. гликозиди) или лекарства за понижаване на кръвното налягане (АСЕ-инхибитори като каптоприл, бета-блокери като атенолол, ангиотензин II рецепторни антагонисти като лосартан),
- лекарства, подпомагащи отделянето на урина (диуретици),
- лекарства, използвани за временно потискане на имунната система (като метотрексат, циклоспорин, такролимус),
- лекарства за лечение на мания и депресии (като литий, селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRI)),
- лекарства за прекъсване на бременност (като мифепристон),
- лекарства за лечение на СПИН (зидовудин).

ОВВО Юноши Грип с храна, напитки и алкохол

Храната не повлиява в значителна степен абсорбцията на това лекарство.

Някои нежелани реакции, като стомашно-чревни и такива, засягащи централната нервна система, са по-вероятни при едновременна употреба на алкохол и ОВВО Юноши Грип.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Бременност

Не приемайте ОБВО Юноши Грип, ако сте в последните 3 месеца от бременността, тъй като това може да увреди плода или да причини проблеми при раждането. Може да причини бъбречни и сърдечни проблеми при още нероденото Ви бебе. Може да повлияе на Вашата склонност и тази на Вашето бебе към кървене и може да бъде причина раждането да започне по-късно или да бъде по-продължително от очакваното. Не трябва да приемате ОБВО Юноши Грип през първите 6 месеца от бременността, освен ако не е абсолютно необходимо и по препоръка на Вашия лекар. Ако се нуждаете от лечение през този период или докато се опитвате да забременеете, трябва да използвате най-ниската доза за възможно най-кратко време. От 20-ата седмица на бременността ОБВО Юноши Грип може да причини бъбречни проблеми при още нероденото Ви бебе, ако се приема повече от няколко дни, което може да доведе до намалено количество на околоплодната течност, която заобикаля бебето (олигохидрамнион) или стесняване на кръвоносен съд в сърцето на бебето (ductus arteriosus). Ако се нуждаете от лечение по-дълго от няколко дни, Вашият лекар може да препоръча допълнително проследяване.

Кърмене

Малки количества ибупрофен могат да преминат в кърмата. Не са известни случаи на нежелани реакции при кърмачета. Следователно, не е задължително да се спира кърменето. Консултирайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

При краткосрочно лечение това лекарство не повлиява или повлиява в незначителна степен способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на ОБВО Юноши Грип

Това лекарство съдържа 5 mg натриев бензоат във всяка дозова единица, които са еквивалентни на 1 mg/ml. Натриевият бензоат може да засили симптомите на жълтеница (пожълтяване на кожата и очите) при новородените (на възраст до 4 седмици).

Това лекарство съдържа 26,9 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във всяка дозова единица. Това количество е еквивалентно на 1,3% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

Това лекарство съдържа малтитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете това лекарство.

Важна информация за някои от съставките на ОБВО Форте Грип

Това лекарство съдържа 10 mg натриев бензоат във всяка дозова единица, които са еквивалентни на 1 mg/ml. Натриевият бензоат може да засили симптомите на жълтеница (пожълтяване на кожата и очите) при новородените (на възраст до 4 седмици).

Това лекарство съдържа 53,7 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във всяка дозова единица. Това количество е еквивалентно на 2,7% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

Това лекарство съдържа малтитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете това лекарство.

За пълния списък с предупреждения и предпазни мерки, моля прочетете Листовката за пациента.

Лекарствените продукти се отпускат **без** лекарско предписание.

Какви са ефектите на ОБВО Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и ОБВО Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше, установени в проучвания?

Тъй като Ibuprofen/Phenylephrine hydrochloride са добре познати вещества и използването им при лечението на посочените терапевтични показания е добре установено, заявителят представи данни от научната литература. Предоставената литература потвърждава ефикасността и безопасността на Ibuprofen/Phenylephrine hydrochloride.

Какви са възможните нежелани реакции на ОБВО Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и ОБВО Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше?

Нежеланите реакции могат да бъдат сведени до минимум чрез употреба на най-ниската ефективна доза за възможно най-кратко време за овладяване на симптомите. В случай на нежелани реакции или ако се съмнявате в нещо, спрете употребата на лекарството и информирайте Вашия лекар възможно най-бързо.

Хората в старческа възраст, които приемат това лекарство, спадат към групата с повишен риск от проблеми, свързани с нежелани реакции.

СПРЕТЕ УПОТРЕБАТА НА ТОВА ЛЕКАРСТВО и помолете Вашия лекар за помощ, ако по време на лечението забележите:

- **симптоми на интестинално (чревно) кървене** като остра коремна болка, черни, катранени изпражнения, повръщане на кръв или тъмни парченца с формата на кафени зърна;
- **симптоми на редки, но сериозни алергични реакции** като влошаване на астма, необясними хрипове или недостиг на въздух, подуване на лицето, езика или гърлото, затруднено дишане, сърцебиене, понижаване на кръвното налягане, водещо до шоково състояние. Тези симптоми могат да се развият дори и след първата употреба на това лекарство. При поява на някой от тези симптоми, незабавно се свържете с Вашия лекар.
- **тежки кожни нежелани реакции (SCAR)** като кожен обрив по цялото тяло, лющене на кожата, образуване на мехури и отлепване на кожата.
- червеникави плоски, подобни на мишена или кръгли петна по торса, често с мехури в центъра, белене на кожата, язви в устата, гърлото, носа, гениталиите и очите. Тези сериозни кожни обриви могат да бъдат предшествани от повишена температура и грипоподобни симптоми [**ексфолиативен дерматит, еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза**];
- широко разпространен обрив, повишена телесна температура и увеличени лимфни възли (**DRESS синдром**)
- червен, люспест, широко разпространен обрив с подкожни подутини и мехури, придружен от повишена температура. Симптомите обикновено се появяват в началото на лечението (**остра генерализирана екзантематозна пустулоза**)
- **симптоми на бъбречно нарушение**, като повишено уриниране или по-малко от обикновеното, мътна урина или кръв в урината, болки в гърба и/или подуване (особено на краката),

- **симптоми на асептичен менингит**, като скованост на врата, главоболие, чувство на отпадналост, треска и дезориентация. Пациенти с автоимунни заболявания (системен лупус еритематозус, заболявания на съединителната тъкан) е по-вероятно да бъдат засегнати.

Ако имате някакви нежелани реакции или ако някои нежелани реакции се влошават, спрете употребата на това лекарство и се свържете с Вашия лекар. Това включва всички възможни нежелани реакции, изброени в тази листовка.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):

- алергични реакции, като кожни обриви (уртикария), сърбеж, лющене
- главоболие, световъртеж, тинитус (шум в ушите)
- лошо храносмилане, киселини или дискомфорт
- стомашни болки или други необичайни стомашни проблеми

За пълния списък с нежелани лекарствени реакции моля прочетете Листовката за пациента, раздел 4 и Кратката характеристика на продукта в т. 4.8 Нежелани лекарствени реакции.

Защо са одобрени ОБВО Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и ОБВО Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше?

Въз основа на натрупания до момента опит от клинична употреба на ОБВО Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и ОБВО Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше може да се направи заключение, че съотношението полза/риск на лекарствения продукт при предложените показания и дозировка и спазване на необходимите предупреждения е положително. Поради това Изпълнителна агенция по лекарствата реши, че ползите са по-големи от риска и препоръча да бъдат одобрени за употреба.

Друга информация за ОБВО Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и ОБВО Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше

Разрешението за употреба е издадено на 11.03.2026 г.

Притежател на разрешенията за употреба е Хеген Фарма България ЕООД, България

Цялата информация за лекарствения продукт (Кратка характеристика на продукта и Листовката за пациента) може да бъде намерена на интернет-страницата на ИАЛ, в раздел „Регистри“.

За повече информация относно лечението с ОБВО Юноши Грип 200 mg/5 mg перорална суспензия в саше и ОБВО Форте Грип 400 mg/10 mg перорална суспензия в саше моля прочетете листовката или се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.